©2021 DJO, LLC
13-7366-0-00000 REV C - 2021-7-7

DJO, LLC
15919 Sea Otter Place
Suite 200
Huntington Beach, CA 92649
U.S.A.

MOS GmbH
Carl-Zeiss-Straße 41
30175 Hannover, Germany

EC REP

CE

MD



2



3

4

5

6b

7

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: The Procare MaxTrax Walker is designed to provide support and immobilization to the lower leg, ankle and foot. As a boot, it may be suitable for treatment of stress fractures of the lower limb, stable ankle and/or foot fractures, acute lateral ankle sprains and Achilles tendon repair. Providing immobilization or controlled movement of the limb or body segment.

CONTRAINDICATIONS: This device is contraindicated for unstable fractures of the lower leg, ankle and foot.

PRESCRIBING INFORMATION: Note: Due to the molded outer sole, the orthopedic walker may be slightly higher than a normal street shoe; therefore an athletic shoe or a street shoe with a ½" heel, may be worn if necessary for patient comfort. A heel lift also may be used in the shoe worn on the non-affected foot.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This device is to be used under the supervision of a healthcare professional. The determination of when to apply the brace and the frequency and duration of use should be strictly at the discretion of the treating physician. Always consult with your physician before making changes to the brace.
- Application of this device is recommended only when the fracture is demonstrably stable and there area acceptable limits of angulation and rotational deformity.
- Do not use this device on patient's incapable of communicating physical discomfort.
- Check your skin frequently for "hot spots" and skin irritation.
- Do not use this device if you cannot feel pressure or pain due to post-op anaesthesia, nerve, skin or other conditions.
- Exercise caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.
- Do not use over open wounds.
- Do not over tighten straps. This may result in reduction of blood flow or sensation.
- Do not modify the device or use the device other than intended.
- If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur using this product, consult your medical professional immediately.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION: For first time application, loosen all straps and open the boot.

1. Two removable foam ankle pads are provided for patient comfort.
2. If pads require adjustment, remove both pads from liner and separate. The smaller pad should be placed in liner Tab #1. V-cutouts, fold side panels toward center. Ensure the three (3) V-cutouts are centered on each panel. **(Fig. 1)** Folded pad should be centered on back of liner with V-cutouts positioned at base of heel. Open side panels of pad and secure on either side of liner Tab #2. Pad should fit around ankle bone when applied correctly. Large pad may be applied directly to liner or secured to liner Tab #2 as needed. Applicable for ankle as small pad. **(Fig. 2)**
3. Place foot in liner and secure with contact closure. Make sure the heel fits snugly into the posterior portion of the liner. Secure the forefoot flap on the liner first followed by the lower leg portion. Make sure liner fits snug top to bottom. **(Fig. 3)**
4. Shaft circumference may be shortened by 2" to accommodate various patient heights. **To Breakdown Uprights:** Secure uprights on edge of table or hard surface. Firmly push down on breaking point of bar. Soft Velcro® strips are included at top of each liner. Following breakdown of bars, the strips may be used to secure top uprights or liner may be folded over uprights if necessary for added comfort and fit. **(Fig. 4)**
5. Spread the two uprights apart and slide them into the boot, aligning uprights with midline of the ankle. Remove plastic inhabits on each end and secure liner. The uprights may be bent to accommodate any leg contour. **(Fig. 5)**
6. The two straps at the ankle joint may be adapted to accommodate the patient's needs. **Prior to securing bootstraps, determine desired ankle strapping method.** Ankle Crossover Strap Conversion: **6a)** Strap is removable and may be secured by feeding through d-ring on opposing upright. **6b)** Strap is designed to be fed through d-ring on opposing forefoot d-ring. Cross Strap 2 over Strap 3, feed through d-ring on opposing upright and secure. Repeat all other bootstraps, starting at the toes and working up the leg.

Instructions for Range-of-Motion hinge adjustment: Slide open cap cover. Turn hinge cap cover to expose pins. Release pins, select correct settings and reinsert pins. Close cap cover. To lock uprights in fixed 90° angle, set both pin settings at 7.5°, 15°, 22.5° or 30° of plantar or dorsiflexion, set one pin at desired setting in location marked "lock" and second pin in corresponding (same number) setting in the open opposing position.

Only tighten cinch screw (with allen wrench), when locked in fixed position of 0°, 7.5°, 15°, 22.5° or 30° of plantar or dorsiflexion. Repeat the procedure for the hinge on opposite side of Walker to match the new settings. **(Fig. 7)**

CLEANING INSTRUCTIONS: To clean liner, hand wash in cold water using mild soap. Air dry. Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.

PATENT PENDING.
INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

RX only.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO PREVISTO: El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

APLICACIONES/INDICACIONES: El andador Procare MaxTrax está diseñado para brindar soporte e inmovilización en la parte inferior de la pierna, tobillo y pie. Puede ser adecuado para el tratamiento de fracturas por tensión de la parte inferior del miembro y del tobillo y/o del pie, esguinces agudos laterales de tobillo y reparaciones del tendón de Aquiles. Proporcionando inmovilización o movimiento controlado a la extremidad o segmento corporal.

CONTRAINDICACIONES: Este dispositivo está contraindicado para fracturas inestables de la parte inferior de la pierna, el tobillo y el pie.

INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIONES: Nota: Debido a la suela exterior moldeada, el andador ortopédico puede ser ligeramente más alto que un zapato normal, por lo que se puede usar un tenis o un zapato de calle con tacón de ½" si es necesario para la comodidad del paciente. También se puede utilizar una tolunera en el zapato del pie no afectado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este dispositivo debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional médico. La decisión de aplicar el dispositivo en cada caso concreto, así como la frecuencia y la duración del uso, corresponde exclusivamente al médico tratante. Consulte siempre a su médico antes de efectuar modificaciones al dispositivo.
- La aplicación de este dispositivo solo se recomienda cuando se pueda demostrar que la fractura es estable y existan límites aceptables de angulación y de rotación.
- No utilice este dispositivo en pacientes incapaces de comunicar su malestar físico.
- Revise su piel con frecuencia para detectar "puntos calientes" e irritación de la piel.
- No utilice este dispositivo si es incapaz de tener sensaciones, ya sea debido a la anestesia posterior a la operación, nervios, piel u otras afecciones de este tipo.
- Para evitar accidentes, sea precavido si ha de caminar por superficies resbaladizas o húmedas.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- No apriete demasiado las correas. Esto podría reducir el flujo sanguíneo o la sensación.
- No modifique el dispositivo ni lo utilice de forma diferente a la prevista.
- Si tiene una reacción alérgica o experimenta picazón y la piel se enrojece después de entrar en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto inmediatamente con el profesional sanitario.
- No utilice el dispositivo si está dañado y/o si el empaque está abierto de fábrica.
- Si se produce dolor, hinchazón, cambios en la sensación u otras reacciones inusuales durante el uso de este producto, consulte inmediatamente con su médico.

NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de que ocurra un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN: Para su colocación por vez primera, afloje las correas y saque el foro de la bota.

1. Se proporcionan dos almohadillas de quita y pon de espuma para el tobillo para la comodidad del paciente.
2. Si las almohadillas requieren ajustes, quite ambas almohadillas del forro y sepárelas. Deberá colocar en el forro la almohadilla más pequeña primero. En los cortes en V, doble los paneles laterales hacia el centro. Asegúrese que las tres (3) tiras de Velcro® estén centradas en cada panel. **(Fig. 1)** La almohadilla doblada debe estar centrada en la parte trasera del forro con los cortes en V posicionados en la base del talón. Abra los paneles laterales de la almohadilla y asegúrelas en cada lado del forro, Tab #2. La almohadilla debería caber alrededor del área del tobillo cuando se coloque correctamente. La almohadilla grande puede aplicarse directamente en el forro o encima de la almohadilla pequeña según sea necesario. La colocación sugerida de la almohadilla pequeña. **(Fig. 2)**
3. Meta el pie en el forro y fíjelo con el cierre de contacto. Asegúrese de que el talón encaje bien en la parte posterior del forro. Fije en primer lugar la aleta de la parte delantera del pie y, a continuación, la parte inferior de la pierna. Asegúrese que el forro esté completamente cómodo. **(Fig. 3)**
4. Hasta tres tiras verticales pueden ser acortadas 2" para acomodar a pacientes de varias estaturas. **Para ajustar las barras verticales:** Asegure las barras verticales en el borde de una mesa o una superficie dura. Firmemente empuje hacia abajo en la parte de ajuste de la barra. La parte superior del forro incorpora suaves tiras Velcro® . Después de ajustar las barras, se deberían colocar las cintas en las barras verticales superiores. Si bien debería ser el forro que se ajuste a la pierna, doblar, si es necesario, para mejorar la comodidad y asegurar un buen ajuste. **(Fig. 4)**
5. Separe las barras verticales utilizando ambas manos y coloque la bota en el pie, alineando las barras verticales con la parte media del tobillo. Quite las fundas de plástico de las barras verticales y fije el forro. Las barras verticales pueden ser para acomodarlas al contorno de la pierna. **(Fig. 5)**
6. Las dos correas de la unión del tobillo pueden ser adaptadas para acomodar las necesidades individuales del paciente. **Antes de fijar las correas, determine el método de amarre del tobillo deseado. Conversión de Amarres Cruzados del Tobillo: 6a)** La correa "1" es extraíble y puede volver a pasar por ojiladora por un anillo en D en la barra vertical opuesta. **6b)** Si se desea el método de Amarres Cruzados, pase la correa "1" a través del anillo en D frontal del lado opuesto. Atraviese la correa "2" sobre la correa "3", páselá a través del anillo en D de la barra vertical del lado opuesto y fíjela. Por el resto de las correas de la bota, comenzando por la puntera y subiendo por la pierna.

Instrucciones para el ajuste de la bisagra antiestática de la articulación mecánica: Deslice la cubierta de tapa. Gire la tapa de la bisagra para dejar a la vista los retenes. Saque los retenes, seleccione los ajustes correctos y vuelva a ponerlos. Cierre la tapa. Para bloquear las partes verticales en un ángulo de 90°, ajuste los dos retenes a 0°. Para fijar en 7.5°, 15°, 22.5° o 30° de flexión plantar o dorsal, coloque un pasador en el lugar deseado en la posición "lock" y un segundo pasador en la configura ción correspondiente (mismo número) en la posición abierta del lado opuesto.

Apriete el tornillo (con una llave allen) sólo cuando esté fijado en la posición de 0°, 7.5°, 15°, 22.5 o 30° de flexión plantar o dorsal. Repita el procedimiento para el bisagra existan bisagra en el lado opuesto del andador para que coincida con los nuevos ajustes. **(Fig. 7)**

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Lave el forro a mano con agua fría utilizando un jabón suave. Secado al aire. Nota: Si no se enjuaga exhaustivamente, los restos de jabón pueden provocar irritación y deterioran el material.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

PATENTE EN TRÁMITE.

NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

Solo CON RECETA.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE EVITAR LAS LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen, und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Die Procare MaxTrax Gehhilfe dient zur Stützung und Immobilisierung des unteren Beins, Sprunggelenks und Fußes. Als Stiefel kann sich für die Behandlung nach Stressfrakturen der unteren Extremität und stabilen Knöchel- und/oder Fußfrakturen, akuten lateralen Knöchelverstauchungen und Achillessehnenreparaturen. Es sorgt für die Ruhigstellung oder kontrollierte Bewegungen der Extremität oder des Körpersegments.

KONTRAINDIKATIONEN: Diese Vorrichtung ist bei instabilen Frakturen des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes kontraindiziert.

INFORMATIONEN ZUR VERSCHREIBUNG: Hinweis: Durch ihre angepasste Außensohle kann die orthopädische Gehhilfe etwas höher sein als ein normaler Straßenschuh sein. Zur Verbesserung des Tragekomforts sollte der Patient ggf. einen Sportschuh oder einen Schuh mit ca. 1,25 cm Absatz tragen. Der Absatz des Schuhs für den gesunden Fuß kann auch erhöht werden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Dieses Produkt ist unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zu verwenden. Der Festlegung, wann der Stütze anzulegen ist, sowie Häufigkeit und Dauer des Gebrauchs sollten ausschließlich im Ermessen des behandelnden Arztes erfolgen. Konsultieren Sie im Vorfeld Ihren Arzt, bevor Sie Änderungen an der Orthese vornehmen.
- Die Anwendung dieser Vorrichtung wird nur empfohlen, wenn die Fraktur nachweislich stabil ist und die Werte der Winkel- und Drehdeformität sich im zumutbaren Rahmen bewegen.
- Diese Vorrichtung nicht an Patienten verwenden, die körperliches Unwohlsein nicht kommunizieren können.
- Prüfen Sie Ihre Haut häufig auf „rote Stellen" und Hautreizungen.
- Diese Vorrichtung nicht verwenden, wenn Sie im betreffenden Bereich haben, sei es aufgrund einer postoperativen Anästhesie bzw. aufgrund von Nerven-, Haut- oder sonstigen Erkrankungen.
- Auf rutschigen bzw. nassen Flächen vorsichtig gehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht auf offenen Wunden verwenden.
- Die Gurte nicht zu stark anziehen. Dies kann zu einer Verringerung der Durchblutung oder der Empfindungsfähigkeit führen.
- Das Produkt nicht modifizieren oder anders als vorgesehen verwenden.
- Wenn eine allergische Reaktion auftritt und/oder bei nach Kontakt mit einem Teil dieser Vorrichtung Juckreiz, Rötungen oder Hautreizungen auftreten, sie das Produkt nicht länger und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

HINWEIS: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH: Beim Erstgebrauch lockern Sie alle Bänder und öffnen Sie den Schutz aus der Box.

1. Zur Verbesserung des Tragekomforts sind zwei herausnehmbare Schaumstoffknöchelpolster vorgesehen.
2. Wenn diese Polster angepasst werden müssen, nehmen Sie sie aus dem Einsatz heraus und trennen Sie sie voneinander. Das kleinere Polster ist in Einsatz-Lasche #1 einzusetzen. Klappen Sie die Seitenteile an den V-Ausschnitten zur Mitte. Anschließend Velcro®-Streifen mittig auf dem Polster ausrichten. Teilen mittig ausgerichtet sind. **(Abb. 1)** Das gefaltete Polster wird in der Mitte der hinteren Einsatzhälfte an der Ferse ausgerichtet. Die Seitenteile des Polsters mit den Ausschnitten an der Basis der Fersenlasche ausrichten. Die Seitenteile des Polsters, und befestigen Sie sie an Einsatz-Lasche #2. Das Polster sollte richtig angebracht wurde, umschließt es den Gelenkbereich vollständig. Das größere Polster kann direkt auf dem Einsatz angebracht oder bedarfsweise mit Lasche #2 befestigt werden. Um das Polster anzubringen, gehen Sie wie beim kleineren Polster vor. **(Abb. 2)**
3. Setzen Sie den Fuß so in den Einsatz, dass die Ferse sich genau in den hinteren Teil schmiegt. Achten Sie darauf, dass die Ferse vollständig vom Einsatz umfasst wird. Führen Sie das Vorfußband am Einsatz und dann die Bänder für den Unterschenkel ein. Stellen Sie sich dann sicher, dass der Fuß und Unterschenkel passgenau sitzt. **(Abb. 3)**
4. Um den Umfang des Schafts an die Größe des Patienten anzupassen, können die beiden Bügel jeweils um ca. 5 cm verkürzt werden. **Kürzung der Bügel:** Stützen Sie die Bügel auf einer harten oder ebenen Oberfläche ab. Drücken Sie den verstellbaren Teil der Schiene fest nach unten. Die weichen Velcro®-Streifen befinden sich oben auf jedem Einsatz. Gemäß der Bügelunterteilung werden die Streifen oben an den Bügeln angebracht. Der Einsatzbügel kann nach Bedarf umgeschlagen werden, um den der Verbesserung von Tragekomfort und Passform dient. **(Abb. 4)**
5. Drücken Sie die Bügel mit beiden Händen nach innen, und richten Sie sie an dem Stiefel. Die Bügel müssen über der Gelenkmitte ausgerichtet sein. Entfernen Sie den D-Frontal des Einsatzes. Führen Sie den Einsatz in die Bügel und fixieren Sie ihn. Sobald der Einsatz gebogen werden, um sie an die Beinform des Patienten anzupassen. **(Abb. 5)**
6. Die Bänder können angepasst werden, um den Bedürfnissen des Patienten entsprechen werden. **Vor der Fixierung der Stiefelbänder müssen Sie die bevorzugte Methode der Fixierung des Knöchels festlegen. Umrüstung auf Gelenkquerband: 6a)** Band 3 kann herausgezogen, durch die Öse des gegenüberliegenden Schafts gezogen und befestigt werden. **6b)** Wenn die Querbandmethode bevorzugt wird, ziehen Sie Band 3 durch die gegenüberliegende Vorfußöse. Legen Sie Band 2 auf Band 3, ziehen Sie das Band durch die Öse an der gegenüberliegenden Schiene, und fixieren Sie es. Fixieren Sie die anderen Stiefelbänder. Beginnen Sie bei den Zehen, und fahren Sie dann mit den anderen Bändern von unten nach oben fort.

Hinweise zur Einstellung des Gelenkgelenks: Schieben Sie den Kappenaufsatz auf. Drehen Sie den Kappenaufsatz des Scharniers, sodass die Stifte zu sehen sind. Nehmen Sie die Stifte heraus, wählen Sie die entsprechende Einstellung, und setzen Sie sie wieder ein. Schließen Sie den Kappenaufsatz. Zur Feststellung der Schafte in 90°-Position werden beide Stifte in die Einstellung eingesetzt. Zur Einstellung der Plantar- bzw. Dorsalflexion auf 7,5°, 15°, 22,5° oder 30° wird jeden Scharnier einer der beiden Stifte in die entsprechende mit "Lock" bezeichnete Gradeinstellung eingesetzt und der zweite Stift in die entgegengesetzte, denselben Zahlenwerte verwendet) in der offenliegenden "Open"-Einstellung eingesetzt.

Die Schraube darf erst (mit dem Inbusschlüssel) angezogen werden, wenn die Plantar- oder Dorsalflexion auf 0°, 7,5°, 15°, 22,5° oder 30° eingestellt ist. Für das andere Scharnier werden die gleichen Einstellungen gewählt. **(Abb. 7)**

REINIGUNGSHINWEISE: Zur Reinigung den Einsatz von Hand mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser waschen. Der Stoff kann an der Luft getrocknet. Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.

GARANTIE: DJO, LLC gewährleistet bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und dessen Bestandteilen Zubehörteile für sechs Monate ab dem Verkaufsdatum. Falls und insoweit die Bedingungen dieser Garantie nicht den örtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften dieser örtlichen Bestimmungen.

ZUM PATENT ANGEMELDET.

NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG.

HINWEIS: BEI DER HERSTELLUNG DIESES PRODUKTS WURDEN MODERNSTE TECHNIKEN ANGEWENDET, UM DIE MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND KOMFORT ZU ERREICHEN. ES BESTEHT JEDOCH KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DURCH DIESES PRODUKT VERURSACHTE VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

PROFILO UTILIZZATORE PREVISTO: Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, del paziente o dal caregiver del paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nelle istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Il tutore Procare MaxTrax è progettato per fornire supporto e immobilizzazione alla parte inferiore della gamba, alla caviglia e al piede. Può essere adatto per il trattamento di fratture da stress della parte inferiore, fratture stabili di piede e/o caviglia, distorsioni laterali acute della caviglia e/o riparazione del tendine d'Achille. Fornisce immobilizzazione o controllo del movimento di un arto o di un segmento del corpo.

CONTROINDICAZIONI: Questo dispositivo è controindicato per le fratture instabili della parte inferiore della gamba, della caviglia e del piede.

INFORMAZIONI PER LA PRESCRIZIONE: Nota: A causa della suola esterna sagomata, lo stivale ortopedico potrebbe essere leggermente più alto di una normale calzatura; pertanto, se necessario per il comfort del paziente, può essere indossata una calzatura sportiva o una calzatura normale con tacco di 1,25 cm per migliorare il comfort. È possibile anche l'uso di un rialzo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI: Consultare sempre il medico o il fisiatra prima di apportare qualsiasi modifica al prodotto. Il prodotto va utilizzato esclusivamente sotto il controllo medico; non è stato concepito per uso privato non assistito. Nel caso in cui si avvertano sintomi quali dolore, gonfiore, mutamenti a livello della sensibilità o qualsiasi altra reazione anomala durante l'utilizzo del prodotto, rivolgersi immediatamente al medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Il dispositivo deve essere utilizzato sotto la supervisione di personale sanitario qualificato. La decisione sull'opportunità o meno dell'applicazione del tutore e su frequenza e durata del suo utilizzo dovrà essere esclusivamente a discrezione del medico curante. Prima di modificare il tutore, consultare sempre il proprio medico curante.
- L'applicazione del presente dispositivo è consigliata esclusivamente quando la frattura è palesemente stabile e i limiti di deformazione angolare e rotazionale sono accettabili.
- Non utilizzare il dispositivo su pazienti non in grado di comunicare i propri disturbi fisici.
- Controllare spesso la pelle per verificare la presenza di aree sensibili e irritazione cutanea.
- Non utilizzare se la pelle è insensibile a causa di anestesia post-operatoria o patologia neurologica, cutanea o di altro tipo.
- Fare attenzione quando si cammina su superfici scivolose o superfici scivolose o bagnate.
- Non usare su ferite aperte.
- Non stringere eccessivamente le fascette. Questo può comportare una riduzione del flusso sanguigno o della sensibilità.
- Non modificare il dispositivo né utilizzarlo in modo diverso da quello previsto. Se si sviluppa una reazione allergica e/o si manifesta una sensazione di prurito o si nota un arrossamento della pelle quando è a contatto con qualsiasi parte del dispositivo, interrompere l'uso e rivolgersi immediatamente all'operatore sanitario.
- Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato e/o la confezione è stata aperta.
- In caso di dolore, gonfiore, variazioni di sensibilità o altre reazioni insolite durante l'uso del prodotto, consultare immediatamente il medico.

NOTA: contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE: Per la prima applicazione, allentare gli strap ed aprire lo stivale. Rimuovere dallo stivale.

1. Vengono forniti due cuscinetti amovibili per la caviglia.
2. Se è necessario regolare i cuscinetti, toglierli dall'imbottitura e separarli. I cuscinetti più piccoli vanno inseriti per primi nell'imbottitura. In corrispondenza dei tagli a V, piegare i pannelli laterali verso il centro. Fare in modo che i 3 Velcro® siano centrati rispetto al pannello. **(Fig. 1)** I cuscinetti piegati devono essere centrati sul retro dell'imbottitura con i tagli a V sulla base del calcagno. Aprire i pannelli laterali del cuscinetto e fissare su entrambi i lati dell'imbottitura. Nota. Se è applicato correttamente, il cuscinetto aderisce perfettamente attorno alla caviglia. Il cuscinetto più grande può essere applicato direttamente all'imbottitura o fissato, secondo necessità, al cuscinetto più piccolo. Modalità di applicazione illustrate a fig. 2.
3. Mettere il piede nell'imbottitura e fissare con il velcro. Verificare che il calcagno sia ben posizionato nella parte posteriore dell'imbottitura. Fissare per prima la facetta dell'avampiede sull'imbottitura, quindi la parte della gamba. Controllare che l'imbottitura sia ben posizionata e aderente sulla parte superiore e inferiore. **(Fig. 3)**
4. Stivale con circonferenza più ampia o più stretta per adattarsi a pazienti di varia statura. **Per accorciare i montanti.** Tenere fermi i montanti sul bordo del tavolo o altra superficie rigida. Premere con forza verso il basso la parte separabile. La parte superiore dell'imbottitura dispone di chiusure mediante velcro®. Dopo l'accorciamento delle barre, è possibile applicare le chiusure sulla parte superiore dei montanti oppure avvolgere l'imbottitura sopra i montanti per accrescerne comfort e calzata. **(Fig. 4)**
5. Aprire i montanti con entrambe le mani e calzare lo stivale, allineando i montanti con l'asse centrale della caviglia. Togliere le protezioni in plastica dai montanti e fissare l'imbottitura. I montanti possono essere piegati per adattarsi al profilo della gamba. **(Fig. 5)**
6. I due strap in corrispondenza dell'articolazione della caviglia possono essere adattati alle esigenze del paziente. **Prima di fissare lo strap per lo stivale, scegliere il metodo migliore per fissarli. Conversione degli strap incrociati della caviglia: 6a)** Lo strap 3 è amovibile e può essere fissato facendolo passare nell'anello a D sul montante opposto. **6b)** Per incrociare lo strap, infilare lo strap 3 nell'anello a D dell'avampiede opposto. Incrociare lo strap 2 sullo strap 3, infilarlo nell'anello a D sul montante opposto e fissarlo. Ripetere tutti gli strap dello stivale, partendo da quelli inferiori e risalendo lungo la gamba.

Istruzioni per la regolazione della cerniera per il range di movimento: Far scorrere la protezione per cappuccio. Ruotare la protezione del cappuccio per esporre i perni. Allentare i perni, selezionare la regolazione corretta e reinserirli. Richiudere la protezione del cappuccio. Per bloccare i montanti a un angolazione fissa di 90°, regolare la regolazione a 0° di entrambi i perni. Per bloccare a 7,5°, 15°, 22,5° o 30° di flessione plantare o dorsiflessione, regolare la regolazione desiderata di un perno (punto indicato con "lock-bloccaggio") e posizionare l'altro perno nella regolazione corrispondente (con lo stesso numero) nella posizione aperta.

Serrare la vite di fermo con una chiave a brugola solo dopo aver eseguito il bloccaggio della flessione plantare o dorsiflessione a 0°, 7,5°, 15°, 22,5° o 30°. Ripetere la procedura per la cerniera sul lato opposto dello stivale. **(Fig.7)**

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Pulire l'imbottitura lavandola a mano in acqua fredda, con un detergente per tessuti delicati. Asciugare all'aria. Nota. Se non risciacquato accuratamente, i residui di sapone potrebbero provocare irritazioni cutanee o danneggiare il materiale.

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto. Nella misura in cui i termini della presente garanzia non risultino conformi alle normative locali, risulteranno applicabili le disposizioni di queste ultime.

BREVETTI IN CORSO DI REGISTRAZIONE.

NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SOLO SU PRESCRIZIONE.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO possa PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient ou à l'aide-soignant du patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des mises en garde qui figurent dans le mode d'emploi, et être en capacité physique de les respecter.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : La botte de marche Procare MaxTrax est conçue pour fournir un soutien et une immobilisation à la jambe, à la cheville et au pied. Elle peut être utilisée pour le traitement de fractures de stress inférieur, fractures stables du pied et/ou cavigila, distorsions latérales aiguës de la cheville et/ou du pied, des fractures stables de la cheville et/ou du pied, des entorses latérales aiguës de la cheville et une réparation du tendon d'Achille. Assure l'immobilisation ou le mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel.

CONTRE-INDICATIONS : Ce dispositif est contre-indiqué pour les fractures instables de la partie inférieure de la jambe, de la cheville et du pied.

INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT : Remarque : Du fait de la semelle extérieure moulée, la botte orthopédique peut être légèrement plus haute qu'une chaussure standard. Dans ce cas, le port d'une chaussure de sport ou d'une chaussure avec un talon d'un centimètre et demi peuvent améliorer le confort du patient. Une semelle intérieure peut également être utilisée avec la chaussure portée au pied non blessé.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Ce dispositif doit être utilisé sous la surveillance d'un professionnel de santé. La détermination du moment où mettre en place la botte ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation relèvent de la discrétion exclusive du médecin traitant. Toujours consulter un médecin avant de modifier l'orthèse.
- L'utilisation de cette botte n'est recommandée que si la stabilité de la fracture est avérée et que les limites de déformation angulaire et rotatoire sont acceptables.
- Ne pas utiliser ce produit sur les patients incapables de communiquer une gêne physique.
- Examiner fréquemment la peau pour déceler la présence de « points chauds » et d'irritation.
- Ne pas utiliser ce dispositif en cas d'insensibilité postopératoire ou due à une maladie des nerfs, de la peau ou autre.
- Faire preuve de prudence lors de déplacements sur des surfaces glissantes ou mouillées pour éviter une blessure.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas trop serrer les sangles. Cela peut entraîner une réduction du flux sanguin ou de la sensibilité.
- Ne pas modifier le dispositif ni l'utiliser autrement que prévu.
- En cas de réaction allergique et/ou de démangeaisons, de rougeurs cutanées après tout contact avec une partie quelconque de ce dispositif, cesser de l'utiliser et consulter immédiatement un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage est ouvert.
- En cas de douleur, de gonflement, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement votre professionnel de santé.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION: Pour la première utilisation, desserrer les sangles et enlever le chausson de la botte.

1. Deux coussinets de mousse sont fournis pour améliorer le confort du patient au niveau de la

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův ošetřovatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění a vhodně k použití a porozumět jim a musí být fyzicky schopen je dodržovat.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ/INDIKACE: Chodicí ortéza Procare MaxTrax je určena k podpoře a imobilizaci dolní části nohy, členku a nohy. Chodidla. Může být vhodná při léčbě stresových zlomenin dolní končetiny, stabilních zlomenin kotníku a nohou chodidla, akutního laterálního vyvinutí kotníku a ruptura Achillovy šlachy. Imobilizuje končetinu nebo část těla či omezuje jejich pohyb.

KONTRAINDIKACE: Tento prostředek je kontraindikován u nestabilních fraktur dolní části nohy, kotníku a chodidla.

INFORMACE K PŘEDPISOVÁNÍ: Pozn.lékaře: Dbejte tvarované podrážce může být vyžadována bota větší než normální velikost. Pro použití jen na jedné obuv, a proto je kvůli pohodlí pacienta v případě nutnosti mezi nosit sportovní obuv nebo tvrdou obuv s podpatkem 1 až 2 cm (½") v závislosti na tom, jaký typ obuvi pacient používá.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tento prostředek je určen k použití pod dohledem zdravotnického pracovníka. Indikace použití ortézy, frekvence a čas používání závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Skór než začnete ortézu upravovat, poraďte se so svým lékařem.
- Tento prostředek se dodává pouze nesterilní pouze tehdy, jestliže je fraktura prokazatelně stabilní a omezení angulární a rotační deformity je přijatelné.
- Nepoužívejte tento prostředek u pacientů, kteří nejsou schopni sdělit, že použití fyzické nepohodlí.
- Pravidelně kontrolujte svou kůži, jestli na ní nenajdete zahřátá (horká) nebo podrážděná místa.
- Prostředek nepoužívejte, pokud máte narušené vnímání tlaku/dotyku kvůli poruchám jakéhokoli nervového onemocnění, jako je například cukrovkové jiného charakteru.
- Při chůzi vždy zajistěte nebo mokrém povrchu bouche opatrní, abyste se nezranili.
- Nepřibližujte na otevřené ohny.
- Popruhy nadměrně neutahujte. Mohlo by dojít k omezení průtoku krve nebo ke změně citlivosti.
- Prostředek neupravujte ani jej nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Pokud se u vás po kontaktu s jakoukoli částí tohoto prostředku objeví alergická reakce, kontaktujte ihned O. zaruzhnut lékaře, který prostředek používat a ihned se obraťte na svého lékaře.
- Nepoužívejte tento prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li otevřen jeho obal.
- Pokud se během používání tohoto produktu objevují bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, obraťte se okamžitě na svého lékaře.

POZNÁMKA: POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

INFORMACE O APLIKACI: Před prvním použitím uvolněte všechny pásky a vyměňte z boty vložku.

1. Kvůli pohodlnému použití jsou dodávány dvě odlehčené, pěnové kotníkové podložky.
2. Pokud je nutné podložky upravit, vyjměte obě podložky z vložky a ořízněte je podle potřeby. Menší podložku je nutno do vložky umístit jako první. U vyšších tvarů v klenbě je třeba menší podložku ořezat. Podložky se vejdou se, že tři (3) proužky se suchými zipy Velcro® jsou na každém kliště vyrovnány. **(Obr. 1)** Přehnutím podložku je možné ořezávat zvlášť části strany vložky tak, aby výřezy tvaru V byly uloženy u základny podpatkové části. Rozevřete postranní kliďa podložky a přiložte je po obou stranách vložky. Poznámka: Při použití podložek je možné podložku v oblasti kotníku podobně podnout. Vždy podložku ze strany ořezávejte, přičemž se řídíte tím, na kterou stranu chcete, aby se podložka ohnula směrem podložky. Malá podložka se aplikuje stejně. **(Obr. 2)**
3. Do vložky podložku nohu a zajistěte z kotníkem a nohou. Zajistěte, aby pata dobře seděla v zadní části vložky. Nejprve zapněte klopu v přední části boty. Poté zapněte střední část. Ujistěte se, že kotníková podložka dobře sedí. **(Obr. 3)**
4. Oba svršky popruhy Velcro® otrže o 5 cm tak, aby ortéza sedla pacientům různé výšky. **Odlomení svislých prvků:** Upevněte prvky na hranu stolu tak, aby přesahovaly okraj stolu. Použijte pevnou podporu, např. kovovou nebo dřevěnou. Pevně zatáhněte za zalamovacích částí tyče. Průžky Svět Velcro® se odlupují/vrtnou. Pomalý pohyb. Po skládání tyčí by e-mail průžky nasadit na horní část vertikálních podpěr. Takisto, ak je to pre pacienta pohodlnejšie alebo ak mu tak vložka lepšie sedí, je možné aj v prípade potreby prehnúť cez vertikálne podpery. **(Obr. z)**
5. Oblečte si nohavice tak, aby nohavice přes svislé prvky, v klíně nohu do topánky. Vertikálne podpery zarovnajte so stredovou časnu členka. Odstráňte plastové pouzdra a přípněte vložku. Svislé prvky lze ohnout tak, aby vyhovovaly pacientovi. Pokud tak, aby vyhovovaly pacientovi. Dva dásky kolem kotníku lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly individuálním potřebám pacienta. **Než přejdete k dalšímu, rozhodněte se pro některou z metod upnutí kotníkových pásků. Zvířená pásky – pevných pásků:** Ako prvý zapnite pás, ktorý je najbližšie k chodidlu a lze jej zapnout prověřením přes D-kroužek na protějším svislém prvku. **Bb)** Potiahnite a si pásky zapnout do kříže, prověřte pásek 1 skrz D-kroužek na protější straně přední části boty. Překlřže pásek 2 přes pásek 1, prověřte skrz D-kroužek na protějším svislém prvku a zapněte. Zapněte všechny zbylé pásky; začněte u prstů a postupujte směrem nahoru.

Pokyny k nastavení čepu, pomocí něhož se upravuje rozsah pohybu: Otevřete krytku. Otočte krytkou čepu a zpřístupněte kolíčky. Vyndejte kolíčky, povolte nastavení a kolíčky zasuňte zpět. Zavřete krytku. Chcete-li svislé prvky zafixovat v úhlu 0°, 5°, 10°, 15°, 22,5° nebo 30°. Postupujte podle pokynů na protější straně ortézy tak, aby nová nastavení byla stejná. **(Obr. 7)**

POKYNY PRE OHLADOM ČISTENIU: Vložku perte ručně ve studené vodě za použití jemného mýdla. Nechejte volně oschnout na vzduchu. Poznámka: Pokud není zbytkové mýdlo důkladně opláchnuto, může dojít k podráždění kůže a poškození materiálu.

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátu predaje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky nebudou v místním předpisu, je ustanovují tyto místní předpisy.

PATENT SE VZTAHUJE.

NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

PROFIL ZAMÝŠĽANÉHO POUŽÍVATEĽA: Určeným používateľom je zdravotnícky pracovník s licenciou, pacient alebo ošetrovateľ pacienta. Používateľ musí byť schopný prečítať všetky pokyny, varovania a upozornenia a vhodne na použitie. Musí im porozumieť a byť fyzicky schopný ich vykonať.

ĎALŠIE POUŽITIE/INDIKÁCIE: Chodiaca ortéza ProCare MaxTrax je určená k podpore a imobilizácii dolnej časti nohy, členku a nohy. Môže byť vhodná na liečenie stresových zlomenín dolnej končatiny, stabilných zlomenín členka a ľavého chodidla, akútneho laterálneho vyvinutí členka a natrhnutia Achillovej šľachy. Znehybňuje alebo regulovaný pohyb končatiny alebo časti tela.

KONTRAINDIKÁCIE: Táto pomôcka je kontraindikovaná pri nestabilných zlomeninách dolnej časti nohy, členka a chodidla.

PREDPISOVANIE INFORMÁCIE: Poznámka: Kvôli tvarovanej podrážke môže byť ortopedickú topánka mierne vyššia ako bežná obuv. Z toho dôvodu sa odporúča nosenie ortézy alebo topánky s podpätkom vo výške 1,25 cm (½"), pre pacienta to môže byť pohodlnejšie. Takisto nosenie ortézy na zdravej nohe nosiť podpätkovú.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Táto pomôcka sa musí používať pod dozorom zdravotníckeho pracovníka. Indikácia použitia ortézy, frekvencia a čas používania závisia od rozhodnutia ošetrujúceho lekára. Skôr než začnete ortézu upravovať, poraďte sa so svojím lekárom.
- Používajte zariadenia sa odporúča iba za predpokladu, že je zlomenina prekážkanie stabilná a že úhlová a rotačná deformita sú prijateľného charakteru.
- Nepoužívajte toto zariadenie u pacientov, ktorí nie sú schopní upozorniť na fyzické nepohodlie.
- Pravidelne kontrolujte, či si na koži nenájdete prelezaniny alebo podráždené miesta.
- Pomôcku nepoužívajte, ak máte narušené vnímanie tlaku/dotyku kvôli poruchám akéhokoľvek nervového ochorenia, ako je napríklad cukrovkové iného charakteru.
- Pri chôdzi vždy dbajte na mokrém povrchu bouche opatrní, abyste sa nezranili.
- Nepribližujte na otvorené ohne.
- Popruhy nadmerne priliš silno. Môže to mať za následok zníženie prítoku krvi alebo citlivosti.
- Pomôcku neupravujte a ani ju nepoužívajte inak, ako je určené.
- Ak po kontakte s akoukoľvek súčasťou tejto pomôcky vás u ako alergickej reakcii alebo ak vás svrbí koža a je červená, prestaňte ju používať a ihneď kontaktujte svojho lekára.
- Pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená alebo ak bolo balenie otvorené.
- Ak sa pri používaní tohto výrobku zjavia bolesť, opuch, zmena citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, okamžite sa obráťte na ošetrovateľa/lekára.

POZNÁMKA: V prípade závažného incidentu súvisiaceho s používaním tejto pomôcky sa obráťte na výrobcu a kompetentný úrad.

NÁVOD NA POUŽITIE: Pri prvom nasadzovaní uvoľnite všetky popruhy a vyberte z topánky vložku.

1. Stopánku sa dodávajú dva snímateľné vankúšiky, s ktorými môže byť topánka pri opätovnej pohodlnejšia.
2. Ak je potrebné vankúšiky upraviť, vyberte ich z vložky a odrežte ich podľa potreby. Najskôr je potrebné vložiť menší vankúšik. Pri vyšších tvare V zahnite bočné panely do strany. Uistite sa, že sú (3) prúžky Velcro® na vankúšiku zarovnané. **(Obr. 1)** Preložený vankúšik môžete orezať. Ak chcete V-tvary vystredený v zadnej časti vložky s výrezmi v tvare V umiestnenými pri stranách. Orezajte iba jednu stranu vankúšika a pripevnite ho na obe strany vložky. Poznámka: Správne nasadený vankúšik by mal sedieť okolo oblasti členka. Ak by vankúšik mohol nasadiť priamo do vložky alebo v prípade potreby použiť navrch mäkkého vankúšika. Spôsob nasadzovania je rovnaký ako u mäkého vankúšika. **(Obr. z)**
3. Nohu zasuňte do vložky a ľavú stranu. Uistite sa, že päta sedí v zadnej časti vložky. Najskôr zapnite prednú časť topánky. Zapnite stredný diel. Uistite sa, že kotníková podložka dobre sedí. **(Obr. 3)**
4. Obe svršok popruhy Velcro® otrežte o 5 cm tak, aby ortéza sedela pacientom různé výšky. **Odlomení svislých prvků:** Upevněte prvky na hranu stolu tak, aby přesahovaly okraj stolu. Použijte pevnou podporu, např. kovovou nebo dřevěnou. Pevně zatáhněte za zalamovacích častí tyče. Prúžky Svět Velcro® sa odlupujú/vrtnou. Pomalý pohyb. Po skládání tyčí by e-mail prúžky nasadiť na horní časť vertikálnych podpier. Takisto, ak je to pre pacienta pohodlnejšie alebo ak mu tak vložka lepšie sedí, je možné aj v prípade potreby prehnúť cez vertikálne podpery. **(Obr. z)**
5. Oblečte si nohavice tak, aby nohavice nohu do boty a svislé prvky povrchu pre stredná časť členka. Odstráňte plastové pouzdra a prípnite vložku. Svislé prvky lze ohnout tak, aby vyhovovaly pacientovi. Dva dásky kolem kotníku lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly individuálním potřebám pacienta. **Než přejdete k dalšímu, rozhodněte se pro některou z metod upnutí kotníkových pásků. Zvířená pásky – pevných pásků:** Ako prvý zapnite pás, ktorý je najbližšie k chodidlu a lze jej zapnout prověřením přes D-kroužek na protějším svislém prvku. **Bb)** Potiahnite a si pásky zapnout do kříže, prověřte pásek 1 skrz D-kroužek na protější straně přední části boty. Překlřže pásek 2 přes pásek 1, prověřte skrz D-kroužek na protějším svislém prvku a zapněte. Zapněte všechny zbylé pásky; začněte u prstů a postupujte směrem nahoru.

6a

6b

Návod k nastavení rozsahu pohybu Vlčka: Odšroubujte skrutku čiapočku. Čiapočku klúč otočte, aby sa odkryli kolíky. Uvoľnite kolíky, zvoľte správne nastavenie a kolíky znovu zasuňte späť. Uzavrite čiapočku. Ak chcete svislé uzamknite vo fixnom 90° uhle nastavením okolo kolíka na 0°. Ak ich chcete uzamknúť v 7,5°, 15°, 22,5° alebo 30°plantárnej alebo dorzálnej flexii, nastavte jeden kolík do požadovanej polohy označenej "kick" a druhý kolíček do odpovedajúcej otvorenej polohy (rovnaké čísla) v otvorenej opornej pozícii.

NÁVOD NA ČISTENIE: Vložku perte ručne v studenej vode s použitím jemného mydla. Sušte na vzduchu. Poznámka: Ak vložku dôkladne neopláchnete, zvyšné mydlo môže spôsobiť podráždenie pokožky a poškodenie materiálu.

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátu predaje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky nebudou v místním předpisu, platia ustanovenia dané miestnymi predpismi.

ŽIADOSŤ O PATENT PODANÁ.

PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PRÍRODNÝ GUMOVÝ LATEX.

IBA KX.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VEĽKÉ ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHOTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL: Den tilsigtede bruger er en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse og forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGT ANVENDELSE/INDIKATIONER: Procare MaxTrax fod- og benskinner er designet til at støtte og immobilisere underben, ankel og fod. Den kan være egnet til behandling af stressfrakturer i underbenet, stabile brud på anklen og/eller foden, akutte laterale ankelforstuvninger, akutte forstrækninger eller afrivninger. Giver immobilisering eller kontrolleret bevægelse af ekstremiteten eller kropsdelen.

KONTRAINDIKATIONER: Produkten er kontraindiceret for instabila frakturer i underbenet, foden och foten.

FÖRSKRIVNINGSINFORMATION: Obs! På grund av den formgjutna ytterskon kan det ortopediska gångskodonet vara större än vanligt. Det är därför en vanlig promenadsko och därför kan en träningssko eller en promenadsko med 1,25 cm klack användas om detta behövs för att patientens komfort. En hälkyft kan också användas i skon på den friska foten.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Denna produkt får endast användas under överseende av sjukvårdspersonal. Det är utelutande den behandlande läkarens bedömning som avgör när ortosen skall användas, samt hur ofta och under vilka förhållanden av användningen av stödet. Rådgör alltid med din läkare innan du gör några ändringar av ortosen.
- Användning av produkten rekommenderas endast när frakturen är bevisligen stabil och det finns godtagbara gränser för angulär och rotationsmässig deformitet.
- Produkten får inte användas på patienter som är oförmögna att uttrycka fysiskt obehag.
- Kontrollera din hud och leta efter varma partier och hudirritationer.
- Använd inte denna produkt om du har känselbortfall på grund av postoperativ bedövning, nerv- eller hudskador eller andra tillstånd.
- Var försiktig när du går på hala eller våta ytor så att du inte skadar dig.
- Använd inte över öppna sår.
- Spänn inte åt remmarna för hårt. Det kan leda till minskat blodflöde eller nedsatt känsel.
- Ändra inte produkten eller använd den på något annat sätt än det den är avsedd för.
- Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klåda och hudrodnad efter att ha kommit i kontakt med någon del av produkten ska du sluta använda den och kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.
- Om smärta, svullnad, känselförändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

ANVENDELSESVEJLEDNING: Ved første anvendelse løsnes alle remme, og foringen tages ud af stellet.

1. Der medfølger to udtagelige skumankelpuder af hensyn til patientens komfort.
2. Hvis buderne kræver justering, tages begge puder ud af foringen og afskæres. Den mindste pude skal anbringes i foringen først. Ved V-udskæringen i midterpositionen skal der være plads til (3) Velcro® bånd centreres på hvert stykke. **(Fig. 1)** Den foldede pude skal centreres bag på foringen med V-udskæringen placeret ved hælens rødende del. Den sidepanelerne på puden og fastgør på begge sider af foringen. Bemærk: Puden skal passe rundt om ankelområdet, når den er lagt på plads. Den store pude kan sættes direkte på foringen eller lægges i lag oven på en ilde puden efter behov. Anvendelse af puden er samme som for den ilde puden. **(Fig. z)**
3. Anbring foden i foringen og fastgør med kontaktklæbning. Sørg for, at hælen passer godt. Fremspænd bagste del. Fastgør forbodtippen på foringen efterfulgt af paden og understøtter. Sørg for, at foringen sidder godt fra øverst til nederst. **(Fig. 3)**
4. Begge bodtrem ikke kan forkortes med 5 cm for at passe til forskellige patienters højde. **Sådan skilles de lodrette dele ad:** Fastgør de lodrette dele på kanten af et bord eller lignende. Brug fast støtte. Tryk fast med den ene af siderne, der kan skilles ad. Der medfølger blede Velcro®-remme øverst i hver foring. Når sidemerne skilles ad, skal remmene fastgøres på ydersiden af de lodrette dele, eller foringen kan om nødvendigt fjernes over de lodrette dele for mere komfort ved anvendelse. **(Fig. 4)**
5. Spred de lodrette dele med begge hænder og træd ind i stellet og juster de patientjustérbare **Sådan stavelementer fastgøres, skal den ønskede ankelfastspændingsmetode bestemmes. Ankelkrydsremsmålang:** **6a)** Rem 3 kan tages af og kan fastgøres ved at føre den gennem hullerne på den modsatte lodrette del. **6b)** Hvis der er behov for krydsfastspænding, føres rem 3 gennem den modsatte D-ring til forboden. Kryds rem 3 over rem 1, før den føres gennem D-ringen på den modsatte lodrette del og fastgør den. Fastgør alle stavelemente, og begynd ved tæerne og arbejd opad bent.

Vejledning til justering af Range-of-Motion-hængsel: Skub kappedæksler op. Drej hængselspærren, så spillerne kommer til syne. Fjiger spillerne, vælg de rigtige indstillinger, og indsæt spillerne igen. Luk kappedæksler. De lodrette dele låses fast i en vinkel på 90° ved at indstille begge spillers indstilling på 0°. Lås fast i 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° i plantar eller dorsalfleksion, set en split på den tilsigtede indstilling på positionen markeret "låst" og den anden split i en tilsvarende (samme nummer) indstilling i den åbne, modsatte position.

Spænd kun strammeskruen (med unbrakonøgle), når den er låst i fast position i 0°, 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° i plantar eller dorsalfleksion. Gentag procedurer for hængslen på stivhens modstatte side, så den passer til de nye indstillinger. **(Fig. 7)**

RENGØRINGSVEJLEDNING: Foringen vaskes i hånden i koldt vand med en mild sæbe. Lufttørres. Bemærk: Skylles produktet ikke grundigt, kan sæberester forårsage irritation og svække materialet.

GARANTI: I op til seks måneder efter salgsdatoen vil DJO, LLC i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse reparere eller udskifte hele udstyret eller dele deraf samt dets tilbehør. I det omfang vilkårene i denne garanti er uforenelige med lokal lovgivning, vil bestemmelserne i den pågældende lokale lovgivning gælde.

PATENTANSØGT.

IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

KUN PÅ RECEPT.

BEMÆRK: SELVOM DER ER ANVENDT DE NYESTE TEKNIKKER MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ MAKSIMAL FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG KOMFORT, ER DER INGEN GARANTI FOR, AT SKADER KAN UNDGÅS VED ANVENDELSE AF DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL: Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten eller patientens vårdare. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt förmögen att följa alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Procare MaxTrax gångstöd är avsett att stötta och immobilisera underbenet, fotleden och foten. Det lämpar sig för användning efter stressfrakturer i underbenet, stabila fotleds- och/eller fotfrakturer, akuta fotledsskador och efter operationer av akillessena. Ger immobilisering eller kontrollerad rörelse av lemmen eller kroppsdelen.

KONTRAINDIKATIONER: Produkten är kontraindicerad för instabila frakturer i underbenet, fotleden och foten.

FÖRSKRIVNINGSINFORMATION: Obs! På grund av den formgjutna ytterskon kan det ortopediska gångskodonet vara större än vanligt. Det är en vanlig promenadsko och därför kan en träningssko eller en promenadsko med 1,25 cm klack användas om detta behövs för att patientens komfort. En hälkyft kan också användas i skon på den friska foten.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Denna produkt får endast användas under överseende av sjukvårdspersonal. Det är utelutande den behandlande läkarens bedömning som avgör när ortosen skall användas, samt hur ofta och under vilka förhållanden av användningen av stödet. Rådgör alltid med din läkare innan du gör några ändringar av ortosen.
- Användning av produkten rekommenderas endast när frakturen är bevisligen stabil och det finns godtagbara gränser för angulär och rotationsmässig deformitet.
- Produkten får inte användas på patienter som är oförmögna att uttrycka fysiskt obehag.
- Kontrollera din hud och leta efter varma partier och hudirritationer.
- Använd inte denna produkt om du har känselbortfall på grund av postoperativ bedövning, nerv- eller hudskador eller andra tillstånd.
- Var försiktig när du går på hala eller våta ytor så att du inte skadar dig.
- Använd inte över öppna sår.
- Spänn inte åt remmarna för hårt. Det kan leda till minskat blodflöde eller nedsatt känsel.
- Ändra inte produkten eller använd den på något annat sätt än det den är avsedd för.
- Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klåda och hudrodnad efter att ha kommit i kontakt med någon del av produkten ska du sluta använda den och kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.
- Om smärta, svullnad, känselförändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän laitteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

INFORMATION OM APPLICERING: Vid första appliceringstillfället, lossa alla remmar och ta ut stödet ur skon.

1. Två avtagbara ankeldynor av skumgummi medföljer för patientens komfort.
2. Om dynorna behöver justeras, ta bort båda dynorna från insatsen och skär dem till. Den mindre dynan skall placeras i insatsen först. Vik sidopanelerna mot mitten vid V-utskärningarna, så att att de tre (3) Velcro®-remmarna på baksida är synliga. Centrera förbodtippen på foringen efterfulgt av paden och understödet. Sörg för, att foringen sidder godt fra øverst til nederst. **(Fig. 3)**
3. Anbring foden i foringen og fastgør med kontaktklæbning. Sørg for, at hælen passer godt. Fremspænd bagste del. Fastgør forbodtippen på foringen efterfulgt af paden og understøtter. Sørg for, at foringen sidder godt fra øverst til nederst. **(Fig. 3)**
4. Begge bodtrem ikke kan forkortes med 5 cm for at passe til forskellige patienters højde. **Sådan skilles de lodrette dele ad:** Fastgør de lodrette dele på kanten af et bord eller lignende. Brug fast støtte. Tryk fast med den ene af siderne, der kan skilles ad. Der medfølger blede Velcro®-remme øverst i hver foring. Når sidemerne skilles ad, skal remmene fastgøres på ydersiden af de lodrette dele, eller foringen kan om nødvendigt fjernes over de lodrette dele for mere komfort ved anvendelse. **(Fig. 4)**
5. Spred de lodrette dele med begge hænder og træd ind i stellet og juster de patientjustérbare **Sådan stavelementer fastgøres, skal den ønskede ankelfastspændingsmetode bestemmes. Ankelkrydsremsmålang:** **6a)** Rem 3 kan tages af og kan fastgøres ved at føre den gennem hullerne på den modsatte lodrette del. **6b)** Hvis der er behov for krydsfastspænding, føres rem 3 gennem den modsatte D-ring til forboden. Kryds rem 3 over rem 1, før den føres gennem D-ringen på den modsatte lodrette del og fastgør den. Fastgør alle stavelemente, og begynd ved tæerne og arbejd opad bent.

Vejledning til justering af Range-of-Motion-hængsel: Skub kappedæksler op. Drej hængselspærren, så spillerne kommer til syne. Fjiger spillerne, vælg de rigtige indstillinger, og indsæt spillerne igen. Luk kappedæksler. De lodrette dele låses fast i en vinkel på 90° ved at indstille begge spillers indstilling på 0°. Lås fast i 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° i plantar eller dorsalfleksion, set en split på den tilsigtede indstilling på positionen markeret "låst" og den anden split i en tilsvarende (samme nummer) indstilling i den åbne, modsatte position.

Spänn endast centrum-skruven (med insexnyckel) vid låsning i fast läge på 0°, 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° plantar flexion eller dorsalflexion. Upprepa proceduren för gångjärnet på motsatt sida av gångstödet för att matcha de nya inställningarna. **(Fig. 7)**

RENGÖRING: Tvätta insatsen för hand i kallt vatten med mild tvål. Låt lufttorka. Obs: Om produkten inte sköljs ordentligt kan kvarvarande tvålrester orsaka irritation och försämra materialet.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum. Om garantins villkor är i strid med lokala bestämmelser ska de lokala bestämmelserna gälla.

PATENT HAR SÖKTS.

EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX).

RECEPTBELAGD.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET: Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuollonalan ammattilainen, potilas tai potilaan omaishoitaja. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja pystyä käytännössä noudattamaan käyttöohjeen kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖAIHEET: Procare MaxTrax -tukikenkä on suunniteltu tukemaan säärtä, nilkkaa ja jalkaterää ja pitämään ne paikallaan. Se voi soveltua käytettäväksi rasitumurtumien, vakaiden nilkka- ja/tai jalkaterän murtumien, akuuttien lateraalisten nilkan nyrjähdysten hoitoon sekä jälkisjänteen korjaukseen. Pitää raajan tai kehonosan paikallaan tai nallitsossa liikkeessä.

VASTA-AINEET: Tämä laite on vasta-aineiden säären, nilkan ja jalkaterän epämuodostumien hoitoon.

MÄÄRÄYSTIEDOT: Huomautus: Muotoutuvasta ulkopohjallisesta johtuen ortopedinen hoitokenkä voi olla hieman korkeampi kuin tavallinen kävelykenkä. Tämän vuoksi potilaan mukavuuden takaamiseksi voidaan harjoitettaessa käytä 1,25 cm (½") korkokenkää tai kävelykenkää, jonka korko on 1,3 cm (½"). Terveessä jalassa voidaan myös käyttää kantapäällekorkoa.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Lääkehoitoa lääkäri voi päättää tuen kestämisestä ja käytön toistumistiheydestä ja kestosta. Pyydä lääkäriltä neuvoa ania, ennen kuin teet mitään säätöjä ortoosiin.
- Laitteen käyttöä suositellaan vain silloin, kun murtuma on selvästi stabiili ja kun angulaarinen ja rotaatiomainen deformaatio ovat hyväksyttyjä rajoissa.
- Älä käytä laitetta potilaalla, jotka eivät kykene viestimään fyysisestä epämukavuuden tunteesta.
- Tarkista ihosi usein vauriokohtien ja ihoärsytysten varalta.
- Älä käytä tätä laitetta, jos naapasi ei ole tuntoa lelkkaan, säärtään jälkeisen puudutuksen takia tai hermo- tai ihosairauden tai muun sairauden vuoksi.
- Liukkailla tai mäkisillä pinnoilla on kävettävä varoen vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä avotulen läheisyydessä.
- Älä kiristä hihnoja liikaa. Tämä voi johtaa verenkierron tai tunnon heikkenemiseen.
- Älä muokkaa laitetta tai käytä sitä muuhun kuin käyttötarkoitukseesa.
- Jos saat allergisen reaktion ja/tai ihosi alkaa kutista tai punoittaa sen jälkeen, kun olet koskettanut jotain tämän laitteen osaa, lopeta laitteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai/tai pakkaus on avattu.
- Kysy välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos koet kipua, turvotusta, tuntoherkkyyden kipua, turvotusta, tuntomuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita.

HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän laitteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

PUKEMISOHJEET: Löysää ensimmäisellä käyttökerralla kaikki kiinnityshihnat ja poista sisus kengästä.

1. Potilaan mukavuuden lisäämiseksi hoitokengässä on kaksi irrotettavaa vaahtomuovista nilkkapehmustetta.
2. Jos pehmusteita on tarpeen pienentää, pehmusteet sisuksesta ja erota ne toisistaan. Pienempi pehmuste tulee sijoittaa sisukseen ensin. Tuki V-aukkoasennossa sisuksessa on kolme (3) Velcro®-tarrnauha keskitetään kunkin kiinnitysnauhan päälle. **(Kuva 1)** Taitettu pehmuste voidaan leikata. Aseta pehmuste sisuksen takaosaan V-leikkausten ollessa kantapään pohjalla. Avaa pehmusteen sivuosat ja kiinnitä ne sisuksen pehmustematon puolelle. Huomaa: Pehmusteen täytyy yletyä oikein asennettuna nilkan ympärille. Suorna pehmusteen voidaan asettaa tarpeen mukaan joko suoraan sisukseen tai pienemmän pehmusteen päälle. Pukeminen on sama kuin pienen pehmusteen kohdalla. **(Kuva z)**
3. Aseta jalka sisukseen ja kiinnitä suljin. Varmista, että jalkapohja on tiiviisti sisuksen takaosassa. Kiinnitä ensin sisukset etuosasta. Kiinnitä sitten säärtä sisuksen alaosan osuus. Varmista, että sisus on tiivis koko kehon ympäri. **(Kuva 3)**
4. Molempia pystyosia voidaan lyhentää 5:1 cm (2") eripituisten potilaiden mukaan. **Pystyosien irrott